

Estomatite Protética em Pacientes com Diabetes

Silveira EK*, Coelho RCL, Neto GBC, Teixeira ALB, Faustino KKP, Diniz TC, Fiallos ACM.

Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, Departamento de Odontologia Reparadora. CE, Brasil.

E-mail: dra.eulakarla@gmail.com

Resumo

O trabalho objetivou realizar uma revisão da literatura sobre estomatite protética em pacientes diabéticos. Realizou-se nas bases de dados BVS e PUBMED, com os descritores: “estomatite sob prótese”, “Candida albicans” e “diabetes”, publicados entre 2006 à 2016, nos idiomas português, espanhol e inglês, sendo selecionados 5 artigos. Muitos estudos afirmam que há relação da diabetes com a EP devido principalmente à hipossalivação, que facilita a adesão dos fungos. Entretanto, a literatura é conflitante, uma vez que estudos clínicos demonstraram que não há relação entre a diabetes e a instalação de EP. Alguns estudos mostraram que a prevalência de EP e C. albicans em pacientes com diabetes é superior aquela encontrada em pacientes sem diabetes, no entanto, outros artigos revelam que a frequência de EP e C. albicans em pacientes diabéticos não foi significativa. É importante observar se esse contraste pode ser pelo fato dos pacientes estudados serem diabéticos controlados ou não. Portanto, embora seja necessário mais estudos, exames clínicos periódicos são fundamentais em busca do diagnóstico precoce e tratamento adequado para estes pacientes.

Palavras-chave: Estomatite sob Prótese. Candida Albicans. Diabetes